CYCLEMYS ORBICULATA, *Bell.*

Testâ suborbiculari, carinatâ, posticè dentatâ, fuscâ; scutis sterni flavescentibus, fusco radiatìm lineatis.

Emys orbiculata. Bell.
Emys Dhor. Gray, Syn. Rept. p. 20.
Cistuda Diardii. Bibron, Hist. Rept. II. p. 227.

Habitat in Indiâ.
Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* suprà planum, scuto unico, glabro tectum, fuscum, rostro nigricante. *Maxillæ* fortes, marginibus undulatis; superior anticè bidentata. *Collum* scabriusculum, rugosum, fuscum. *Pedes anteriores* nigricantes, suprà squamis transversis, imbricatis, palmæ, squamalis rotundis, tectæ: *ungues* curvi, breves, subacuti. *Pedes posteriores* rugosi, scabriusculi, digitis et plantis squamatis. *Cauda* mediocris, tenuis, acuta, scabra, nigricans. *Testa* suborbicularis, anticè levitèr emarginata, posticè utrinque quinque-dentata, suprà plana, carinata, ad latera declivis. *Scuta dorsalia* fusca, colore pallidiore obsoletè radiata et variegata, levitèr sulcata: *vertebralia* carinata, areolis ad marginem posteriorem positis; carinâ nigrâ, anticè et posticè elevatiusculâ, medio depressâ; primum arceolatum, altè carinatum anticè utrinque depressum; secundum, tertium et quartum hexagona; quintum irregularitèr sexlaterale, posticè expansum, lateribus postico-externis brevissimis: *costalia* declivia, suprà obsoletè carinata; primum figuræ irregularis, subtriangulare, margine externo rotundato, anticè excavatum; secundum et tertium quadrato-pentagona; quartum quadratum vel rhomboidale: *marginalia* præcipuè quadrata; anteriora ferè horizontalia; lateralia declivia; posteriora paulò recurva, octavum utrinque usque ad duodecimum angulo postico prominente, marginem testæ dentatum reddentia. *Scutum nuchale* lanceolatum, elevatum, anticè prominens, nigrum. *Sternum* latissimum, medio planum, anticè et posticè versus testam dorsalem paulò elevatum, anticè porrectum, truncatum vel subemarginatum, posticè emarginatum, testam dorsalem longitudine ferè æquans: *scuta* flavescentia, fusco radiatùm lineata, areolis posticis: *gularia*